

双线盗毒蛾

双线盗毒蛾，又名棕衣黄毒蛾。属鳞翅目、毒蛾科。分布于广东、广西、福建、台湾、四川等省(自治区)。为害荔枝、龙眼、柑橘、梨、桃等果树及农作物等的新梢嫩叶、花蕾、花穗、幼果。



图 1：双线盗毒蛾卵块

图 2：双线盗毒蛾低龄幼虫



图 3：双线盗毒蛾成虫

图 4：双线盗毒蛾幼虫

为害状：

幼虫咬食新梢嫩叶，使叶片成缺刻或只剩叶脉，咬食花器和谢花后的小果，使受害花、果脱落。

生活习性：

此虫在福南方地区年发生 3-5 代，以幼虫越冬，但冬季气温较暖时，幼虫仍可取食活动。成虫于傍晚或夜间羽化，有趋光性。卵产在叶背或花穗枝梗上。初孵幼虫有群集性，在叶背取食叶肉，残留上表皮；2-3 龄分散为害，常将叶片咬成缺刻、穿孔，或咬坏花器，或咬食刚谢花的幼果。老熟幼虫入表土层结茧化蛹。在广西的西南部，4-5 月，幼虫为害龙眼、荔枝的花穗和刚谢花后的小幼果较重，以后各代多为害新梢嫩叶。

防治方法：

- 1、冬季中耕松土，修剪病虫枝，清除枯枝落叶可减少越冬虫源。
- 2、掌握在幼虫幼龄阶段，或开花前，抽梢期，选用 90% 敌百虫晶体 800~1000 倍液，2.5% 三氟氯氰菊酯乳油或 10% 氯氰菊酯乳油 2000 倍液，48% 毒死蜱乳油 1000 倍液防治有效。