

龙眼鸡

龙眼鸡为同翅目，蜡蝉科。在广东、广西、福建都广有分布。为害荔枝、龙眼、橄榄、芒果等果树。其中以龙眼受害最重。无论成虫、若虫均吸食寄主枝干汁液，使枝条干枯、树势衰弱；其排泄物还可诱发煤烟病。



为害状：

若虫和成虫刺吸树干或枝梢的汁液，发生严重时，可使枝条衰弱、干枯，还会导致落果，其排泄物可引起煤烟病。

生活习性：

成长一年发生 1 次，以成虫静伏在果树枝条分叉处下侧越冬。第二年 3 月上、中旬恢复活动，4 月后飞翔活跃，5 月为交尾盛



期，交尾后 7-14 天开始产卵，卵多产在 2 米左右高的树干平坦处和径粗为 5-15 毫米的枝条上。每雌虫一般产 1 卵块，每块有卵 60-100 粒，数行纵列成长方形，并被有白色蜡粉。卵期 19-30 天，平均 25 天左右。6 月份卵陆续孵出若虫，初孵若虫静伏在卵块上 1 天后才开始分散活

动。9 月出现新成虫。若虫善弹跳，成虫善跳能飞。一旦受惊扰，若虫便弹跳逃逸，成虫迅速弹跳飞逃。

防治方法：

- 1、在越冬成虫产卵前进行人工捕捉。在产卵期，结合修剪或疏枝，剪除或刮除卵块。若虫期扫落虫灭之。
- 2、保护天敌。
- 3、在若虫低龄期喷药防治，可喷洒 90%敌百虫晶体 800~1000 倍液，或 52.25%农地乐乳油 1500~2000 倍液，或 2.5%溴氰菊酯（敌杀死）

乳油 2500~3000 倍液，或 48%毒死蜱（乐斯本）1000 倍液，或 20%甲氰菊酯(灭扫利)乳油 1000 倍液加 YZ-910 展着剂 3000 倍喷雾防治。